

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE
CPPAP N° 523 AD

EDITION DE LA STATION « ALSACE ET LORRAINE »

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. (88) 61.49.50 Poste 454

DLP-5-9-79164531

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, rue des Mineurs

67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 55-08 00 F

Bulletin n° 28

3 septembre 1979

GRANDES CULTURES

- BETTERAVES INDUSTRIELLES -

CERCOSPORIOSE

Les pluies orageuses, localement importantes, tombées dans la période du 15 au 25 août, ont été favorables à l'installation de la cercosporiose. Des foyers de cette maladie peuvent s'observer depuis quelques jours dans le Bas-Rhin (Ried-sud, Ackerland-Kochersberg...) et le Haut-Rhin (secteurs de MORSCHWILLER, SIERENTZ...).

Comme les fortes rosées matinales de ces derniers jours et les récentes précipitations favorisent le développement de cette maladie, il est conseillé d'intervenir rapidement dans ces situations.

Les fongicides suivants pourront être utilisés (doses exprimées en m. a./ha) :

- bénomyl à 150 g
- carbendazime à 150 g
- thiabendazole à 100 g
- manèbe + méthylthiophanate : 1 000 + 500 g.

A signaler que la cercosporiose provoque la formation de petites taches rondes, bordées de rouge-brun, disséminées sur les feuilles et dont la multiplication entraîne le dessèchement du feuillage.

- POMMES DE TERRE -

(Cultures d'altitude)

MILDIOU

Sur les variétés tardives implantées dans les zones d'altitude dont on désire encore maintenir la végétation, un dernier traitement fongicide est recommandé. En cas de développement rapide de la maladie, ne pas attendre pour procéder au défanage chimique.

.../...

- HOUBLON -

MILDIOU

Dans les houblonnières où la récolte aura lieu après le 8 septembre, renouveler le traitement fongicide avant la fin de la semaine. Cette application est à effectuer avec soin. Elle doit assurer la parfaite protection des cônes.

OIDIUM

Ajouter un anti-oïdium à la bouillie anti-mildiou. A préciser que l'utilisation du soufre implique de traiter en-dehors des heures chaudes de la journée.

PUCERONS - ARAIGNEES ROUGES

Suivre l'évolution de ces ravageurs et intervenir si nécessaire dans les houblonnières récoltées tardivement. Ne pas oublier que les pucerons et les araignées rouges occasionnent parfois des dégâts à ce stade de développement de la culture.

Respecter strictement les délais d'emploi des produits avant la récolte.

VIGNE

BOTRYTIS (pourriture grise)

La pourriture commence à s'installer dans certaines parcelles de vigne sensibles à ce champignon. Dans ces situations, le traitement conseillé un mois avant les vendanges (selon la méthode standard) pourra dès à présent être appliqué.

Pour de plus amples informations à ce sujet et notamment pour le choix des produits, consulter notre bulletin n° 18 du 21 juin 1979.

CULTURES MARAICHIERES

- POIREAU -

TEIGNE

Le temps chaud pendant les derniers jours d'août a été favorable à l'activité des papillons. Dans ces conditions, renouveler le traitement insecticide, notamment sur les plantations de poireaux d'hiver avant le 9 septembre.

Utiliser l'un des produits suivants, auquel on adjoindra un mouillant :

- azinphos à 40 g/hl
- Bacillus thuringiensis : dose selon spécialité
- carbaryl à 75 g/hl
- chlorfenvinphos à 40 g/hl
- chlorpyrifos à 45 g/hl
- malathion à 75 g/hl
- méthidathion à 30 g/hl
- parathion éthyl à 25 g/hl
- parathion méthyl à 40 g/hl
- phosalone à 60 g/hl
- tétrachlorvinphos à 150 g/hl.

Pour le choix du produit, tenir compte des délais d'emploi avant la récolte.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER